

PIANO DI ALLEVAMENTO

Sono diversi i fattori che un buon allevatore dovrebbe prendere in considerazione. Per tenere sotto controllo tutti i fattori principali, potrete usare questo semplice prospetto che vi guiderà passo per passo.

Questo piano vi guiderà durante tutto il periodo di allevamento. Semplice ma efficace! In aggiunta riceverete una dettagliata scheda per il programma d'alimentazione e cura. Seguite questi consigli ed ottimizzerete i risultati nel vostro allevamento!

	quando	cosa	fatto
1	dopo il periodo della muta	Liberate le vostre colombaie dai parassiti. Usate un disinfettante e un bruciatore a gas	☐
2	6 settimane prima dell'accoppiamento	i vostri colombi sono stati visitati da un veterinario e curati con i corretti trattamenti in caso di malattia.	☐
3	4 settimane prima dell'accoppiamento	o vaccinazione contro la paramixovirosi o pseudopeste aviaria o somministrate ai vostri colombi miscele a basso tenore proteico	☐
4	3 settimane prima dell'accoppiamento	o portare i colombi fuori dal "letargo" gradatamente aumentando il periodo di luce dalle 7 del mattino fino alle 9 della sera o aggiungere OMNIFORM (10ml per litro) + OROVITAL (10ml per litro) all'acqua da bere tre volte alla settimana	☐
5	2 o 3 settimane prima dell'accoppiamento	Assicuratevi che il maschio e la femmina si conoscano già prima di formare la coppia. Si raccomanda pertanto di metterli entrambi in una mezza posta per mezza giornata.	☐
6	8 giorni prima dell'accoppiamento fino alla deposizione del secondo uovo	Inumidite le vostre miscele con FERTI-OIL e FORM-MIX PLUS per aumentare il desiderio sessuale e la fertilità.	☐
7	durante l'accoppiamento	Chiudete ogni coppia nella propria posta due ore prima che faccia buio. Mettere sempre a disposizione 1 cucchiaino da caffè di grit + pietra rossa.	☐



PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE

metodo Plus IC+

	mattino	sera	commenti
6 settimane prima dell'accoppiamento	100% Plus I.C.+ Gerry	100% Plus I.C.+ Gerry	*Consultare un veterinario per verificare la presenza di paratifo, coccidiosi, tricominosi e vermi
8 giorni prima dell'accoppiamento	50% Plus I.C.+ Gerry + 50% Plus I.C.+ Start	50% Plus I.C.+ Gerry + 50% Plus I.C.+ Start	*Inumidire le miscele con FERTI-OIL e FORMA-MIX-PLUS quotidianamente da 8 giorni prima dell'accoppiamento fino alla deposizione del secondo uovo.
durante la cova	100% Plus I.C.+ Gerry o 100% Plus I.C.+ Depure	100% Plus I.C.+ Gerry o 100% Plus I.C.+ Depure	
da 3 giorni prima della schiusa fino allo svezzamento	Plus I.C.+ Start sempre a disposizione senza limitazioni	Plus I.C.+ Start sempre a disposizione senza limitazioni	*Lasciare sempre a disposizione Colombine All-in-One aggiungendone tutti i giorni



PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE

metodo Plus IC+ Black Label

	mattino	sera	commenti
6 settimane prima dell'accoppiamento	100% Plus I.C.+ Black Label Gerry	100% Plus I.C.+ Black Label Gerry	*Consultare un veterinario per verificare la presenza di paratifo, coccidiosi, tricomonosi e vermi
8 giorni prima dell'accoppiamento	50% Plus I.C.+ Black Label Gerry + 50% Plus I.C.+ Black Label Start	50% Plus I.C.+ Black Label Gerry + 50% Plus I.C.+ Black Label Start	*Inumidire le miscele con FERTI-OIL e FORMA-MIX-PLUS quotidianamente da 8 giorni prima dell'accoppiamento fino alla deposizione del secondo uovo.
durante la cova	100% Plus I.C.+ Black Label Gerry	100% Plus I.C.+ Black Label Gerry	
da 3 giorni prima della schiusa fino allo svezzamento	Plus I.C.+ Black Label Start sempre a disposizione senza limitazioni	Plus I.C.+ Black Label Start sempre a disposizione senza limitazioni	*Lasciare sempre a disposizione Colombine All-in-One aggiungendone tutti i giorni



PROGRAMMA DI CURA

	sabato	domenica	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
mescolare nel cibo		GARLIC OIL + B-PURE		GARLIC OIL + B-PURE		GARLIC OIL + B-PURE	
mescolare nell'acqua	SUPERVIT* o DUCOLVIT	HERBOLAN	HERBOLAN	SUPERVIT* o DUCOLVIT			

* Quando si utilizza il metodo di alimentazione Plus I.C.+ non è necessario aggiungere SUPERVIT o DUCOLVIT negli alimenti o nell'acqua da bere.



YOUR BEST CHOICE



www.versele-laga.com